

گازگرفتگی توسط حیوانات یا انسان

مراقبت در منزل و نکات پرستاری :

1. اگر به حیوانی که به شما حمله کرده است دسترسی دارید، حیوان را در مکان ایمنی حداقل به مدت 10 روز حبس و نگاه داری کرده و بروز هرگونه علایم بیماری و ناخوشی یا هر رفتار غیرطبیعی در او را به دامپزشک یا مرکز بهداشتی گزارش دهید.

2. جهت پیش گیری از بروز هاری واکسنی وجود دارد که لازم است حتما در 3-5 نوبت پس از گازگرفتگی توسط حیوان مشکوک تزریق شود .

3. اگر توسط فرد آشنایی که قطعا به بیماری های واگیردار (مثل هپاتیت یا ایدز) مبتلا بوده یا اعتیاد به مواد مخدر در او وجود دارد دچار گازگرفتگی شده اید حتما وضعیت او را به پزشک اطلاع دهید تا در صورت نیاز واکسن های لازم مثل واکسن هپاتیت به شما تزریق گردد، توصیه می شود در صورت امکان (دسترسی به آن فرد و موافقت وی) خود او نیز به پزشک شما مراجعه کند .

4. اگر توسط فردی که از سابقه ی ابتلای او به بیماری های مختلف یا وجود اعتیاد در او اطلاع ندارید دچار گازگرفتگی شده اید حتما وضعیت را به پزشک اطلاع دهید و در صورت امکان (دسترسی به آن فرد و موافقت وی) خود او نیز جهت بررسی به پزشک مراجعه نماید .

5. در صورت امکان روزانه 2 نوبت با تب سنج دمای بدن خود را اندازه بگیرید .

6. توجه کنید که همه ی زخم ها نیاز به پانسمان ندارند و ممکن است زخم شما (به خصوص زخم های پوست سر و صورت) پس از شستشو و حتی بخیه زدن بدون پانسمان رها شود، در این صورت شخصا اقدام به پوشاندن زخم با پانسمان های سنگین نکنید .

7. در صورتی که زخم شما بخیه نشده است، زخم را روزانه طبق دستور شستشو داده (با سرم نمکی مخصوص شستشو) و اگر هنگام ترخیص زخم پانسمان شده است، پانسمان آن را تعویض کنید.

روزانه زخم خود را از نظر بروز علائم زیر بررسی کنید :

1. تورم و قرمزی اطراف محل زخم

2. احساس درد شدید هنگام لمس کردن زخم یا اطراف آن

3. وضعیت ترشحات

4. خونریزی

5. خطوط قرمز رنگ و برجسته در اطراف زخم

6. تورم و سختی حرکات مفاصل اندام

داروها در منزل :

1. به هیچ وجه از الکل، بتادین، آب اکسیژنه، محلول های ضدعفونی کننده، کرم های آرایشی یا نرم کننده، روغن های معطر یا پمادهای کورتونی (تریامسینولون، کلوبتازول، هیدروکورتیزون) بر روی زخم استفاده نکنید، این مواد باعث تحریک پوست، بروز حساسیت و عفونت و تاخیر در ترمیم زخم خواهند شد .

2. روزهای اول ممکن است احساس درد و سوزش خفیف در محل زخم داشته باشید که برای رفع آن می توانید از استامینوفن استفاده کنید، ترکیبات حاوی آسپیرین ممکن است باعث بروز خونریزی شوند

3. در صورتی که هنگام ترخیص برای شما آنتی بیوتیک تجویز شده است، تنها همان دارو را در زمان معین مصرف کرده و دوره ی درمان را حتما کامل کنید .



دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی کردستان

بیمارستان امام حسین (ع) بیجار
گازگرفتگی توسط حیوانات یا انسان



شماره تلفن: 08738236068

وب سایت بیمارستان :

muk.ac.ir/Muk/Hospitals/HosBijar.aspx

واحد آموزش سلامت

سال 1403

10. بروز تب

منبع: دستورالعمل یکپارچه ترخیص از اورژانس دیتا

4. از مصرف ترکیبات مختلف تزریقی یا خوراکی کورتون دار (مثل دگزامتازون، بتامتازون، هیدروکورتیزون، پردنیزولون) به طور خودسرانه و بدون دستور پزشک کاملاً خودداری نمایید.

علائم هشدار و زمان مراجعه به پزشک

1. آسیب یا پارگی بخیه ها و باز شدن مجدد زخم
2. درد شدید در محل زخم یا اطراف آن
3. تورم یا قرمزی محل زخم
4. خروج چرک یا ترشحات سبز رنگ از زخم یا تشدید ترشحات اولیه
5. استشمام بوی بد از زخم
6. تغییر رنگ و سیاه شدن پوست روی زخم
7. خونریزی مجدد زخم به طوری که پس از 10-15 دقیقه فشار مداوم روی محل زخم متوقف نشود
8. بروز خطوط قرمز رنگ و برجسته در اطراف محل زخم
9. محدودیت حرکت، درد یا تورم در انگشتان یا مفاصل نزدیک به زخم