



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

بیمارستان شفا شهرستان سبز



موضوع:

عفونت ادراری در کودکان



ژیلا قایشی

واحد آموزش بیمارستان شفا

به کودک توصیه کنید از نگه داشتن ادرار خودداری کند و حداقل روزی ۴ بار تخلیه کامل ادرار داشته باشد .

جهت انجام آزمایش نمونه ادرار گرفته شده در منزل تا بردن به آزمایشگاه در یخچال و محل خنک نگهداری شود .



با آرزوی سلامتی و بهبودی برای شما عزیزان

اگر کودکان مستعد ابتلا به عفونت ادراری است چه نکاتی را باید رعایت کنید ؟

داروهای تجویز شده را به موقع و به میزان صحیح به فرزندتان بدهید .

از مصرف نوشیدنی های کافئین دار به علت خاصیت تحریک کنندگی مثانه اجتناب کنید .

در صورتی که کودکان تب دارد و به صورت مکرر به عفونت ادراری مبتلا می شود حتما به پزشک مراجعه کنید .

در شیر خوار دختر در صورت استفاده از دستمال مرطوب از جلو به عقب استفاده شود .

شیر خوار پسر حتما ختنه شود و در صورت ختنه نشدن پوست سر آلت باید همیشه تمیز نگه داشته شود .

از پوشیدن لباس تنگ یا سفت بستن پوشک خودداری کنید .

از استفاده از وان و نشستن در آن به منظور استحمام خودداری کنید .

برخی از عفونت های دستگاه ادراری به علت وجود ناهنجاری در سیستم ادراری کودک به وجود می آید .

به طور مثال در برخی از کودکان برگشت جریان ادرار به کلیه وجود دارد که به این حالت ریفلاکس گفته می شود و ممکن است کودکان را بیشتر در معرض عفونت قرار دهد .

عوارض جانبی همه آنتی بیوتیک ها معمولا مختصر است ،اما ممکن است کودکان ناراحتی معده ،اسهال یا ضایعات پوستی را نشان دهد .

معمولا علائم کودکان پس از مصرف آنتی بیوتیک در طول دو یا سه روز برطرف می شود اطمینان یافتن از این که کودکان آنتی بیوتیک ها را در مدت زمان توصیه شده توسط پزشک مصرف کرده مهم است به عبارت دیگر احتمال بیمار شدن مجدد کودکان وجود دارد .


تشخیص: پزشک معمولا با ارسال آزمایش ادرار کودکان بیماری را تشخیص می دهد .

درمان: اکثر کودکان مبتلا به عفونت ادراری می توانند به راحتی با آنتی بیوتیک درمان شوند ممکن است برای مداوای کودکانی که به طور مکرر به عفونت ادراری مبتلا می شوند و ناهنجاری در سیستم ادراری دارند از روش جراحی استفاده می کنند .

آنتی بیوتیکها به درمان عفونت ادراری کمک کرده و از آسیب به کلیه ها پیشگیری می کنند .

دوره مصرف آنتی بیوتیک برای کودکان ممکن است پنج تا هفت روز طول بکشد .

درمان آنتی بیوتیک ممکن است به صورت قرص یا شربت یا در صورت شدید بودن بیماری ممکن است به صورت تزریقی و در بیمارستان انجام شود.



تعریف: عفونت دستگاه ادراری توسط میکروب های در حال رشد در بخش هایی از بدن کودکان که ادرار را حمل می کنند ایجاد می شود که می تواند بر مثانه، کلیه ها و لوله هایی که ادرار را جمع می کنند اثر بگذارد .

درمان عفونت های دستگاه ادراری آسان است اما کشف کردن آنها می تواند مشکل باشد.

کودکان ممکن است بدون هیچ دلیل آشکار بیمار به نظر برسند. عفونت دستگاه ادراری می تواند به کلیه های کودکان صدمه بزند، بنابراین مراجعه به پزشک ضرورت دارد.

علائم: اگر کودکان عفونت دستگاه ادراری داشته باشند اغلب تشخیص آن دشوار است. نشانه ها می تواند شامل: تب استفراغ و اسهال باشد کودکان ممکن است اشتهای غذا خوردن نداشته باشد. بعضی از کودکان ادرار تیره یا ادرار با بوی نامطبوع دارند و یا به سختی ادرار می کنند و یا نیاز به ادرار کردن با فواصل کم دارند. کودکان ممکن است از درد شکم یا درد هنگام ادرار کردن شاکی باشد.